

# DIARREA RECURRENTE Y OBESIDAD? ...CUANDO LA CLÍNICA NO ENCAJA.

C.M. Angelats (1), M. Ramos(2), D. Gomez(2), S. Cesin(1), S. Kalbouza(1)



(1) Hospital de Gandía y Centro de Especialidades Francesc de Borja, Gandía Servicio de Pediatría.

(2) Centro de salud de Beniopa.

## Introducción

- Globalmente la tasas de alergias alimentarias estarían alrededor del 7% en poblaciones pediátricas.
- Actualmente no existen estudios fiables sobre las alergias no IgE.
- La enterocolitis inducida por proteínas alimentarias (FPIES), es un tipo de alergia no IgE mediada poco conocida, de difícil diagnóstico, y potencialmente grave.

CASO	
<b>EDAD</b>	18 meses (varón)
<b>ANTCEDENTES</b>	Lactancia artificial. No atopias. Dependiente de servicios sociales. AF: Madre obesa. HTA Benigna
<b>ANAMNESIS</b>	Intolerancia a la LV desde los 3 m de vida, presentando a las 4 h, cuadros de vómitos, diarreas, algunos con deshidratación y palidez que en algún caso motivaron su atención en urgencias. No mejora con leche sin lactosa. Tolera leche de almendras
<b>EXPLORACIÓN</b>	Sobrepeso. IMC 19.67 (p96 1.84 sds )
<b>DIAGNOSTICO DIFERENCIAL</b>	Alergia a proteínas vacunas IgE mediadas y no mediadas. Intolerancia a lactosa. GEA infecciosas de repetición Parasitosis intestinal Enfermedad celiaca
<b>LABORATORIO</b>	Analítica de sangre normal. Coprocultivo y parásitos negativos. IgE específicas y Prick test fueron negativos.
<b>DIAGNÓSTICO</b>	Enterocolitis inducida por proteínas de leche de vaca (FPIES)
<b>TRATAMIENTO</b>	Actualmente tolera formula hidrolizada
<b>EVOLUCION</b>	Estable en espera de pruebas de provocación por parte de gastroenterología pediátrica.



## CONCLUSIONES

- El caso que presentamos es un lactante con una historia clínica compatible con un FPIES, con una ganancia de peso exagerada, debida al sustituto que ha recibido, lo cual produjo un retraso importante en el diagnóstico.
- El diagnóstico es básicamente clínico, aunque se pueden usar pruebas de provocación.
- El tratamiento ha sido la sustitución de la leche de almendras por una formula hidrolizada en espera de nueva prueba de tolerancia según evolución.